Motilitas dan Recovery Rate Spermatozoa Ayam Kampung dengan berbagai Waktu Pre-freezing

Nurwahidah^{1*}, Muhammad Erik Kurniawan¹

¹ Program Studi Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sinjai.

Jl. Teuku Umar No. 8, Biringere, Sinjai Utara 92611, Sulawesi Selatan, Indonesia

*nurwahidah1099@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 23 Juni 2021
Hasil revisi diterima 24
Juni 2021
Diterbitkan 24 Juni
2021
Publish online 24 Juni
2021

Kata-kata kunci:
Ayam Kampung;
Spermatozoa;
Waktu pre-freezing;
Motilitas;
Recovery rate;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu prefreezing terhadap motilitas dan *recovery rate* (RR) spermatozoa ayam kampung. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 taraf perlakuan yaitu tanpa *pre-freezing*, lama *pre-freezing* 5 menit, lama *pre-freezing* 10 menit, lama *pre-freezing* 15 menit, lama *pre-freezing* 20 menit. Semen yang telah dikoleksi dari ayam kampung selanjutnya diencerkan dan dikemas ke dalam straw. Straw diekuilibrasi selama 2 jam kemudian ditempatkan di atas permukaan nitrogen cair dengan jarak 4 cm (*pre-freezing*) dengan waktu sesuai perlakuan. Setelah *pre-freezing* dimasukkan ke dalam container selama 24 jam kemudian *thawing* pada suhu 37° C untuk diperiksa motilitas dan *recovery rate* (RR) spermatozoanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa waktu *pre-freezing* mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap motilitas dan RR spermatozoa. Berdasarkan penelitian ini, waktu yang terbaik untuk proses *pre-freezing* pada spermatozoa ayam kampung yaitu 20 menit.

ARTICLE INFO

Article history
Received 23 June 2021
Received in revised
from 23 June 2021
Accepted 24 June 2021
Available online. 24
June 2021

Key Words:
Kampung chicken;
Spermatozoa;
Pre-freezing time;
Motility;
Recovery rate;

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of pre-freezing time on motility and recovery rate (RR) of Kampung chicken spermatozoa. The experimental design used in this study was a completely randomized design (CRD) with 5 levels of treatment, namely no pre-freezing, 5 minutes of pre-freezing, 10 minutes of pre-freezing, 15 minutes of pre-freezing, and 20 minutes of pre-freezing. The semen that has been collected from Kampung chickens is then diluted and packed into straws. Straw was equilibrated for 2 hours and then placed on the surface of liquid nitrogen with a distance of 4 cm (*pre-freezing*) with the appropriate time of treatment. After being pre-frozen, it was put in a container for 24 hours and then thawed at 37°C to check the motility and recovery rate (RR) of the spermatozoa. The results of this study indicate that the pre-freezing time has a very significant effect on the motility and RR of spermatozoa. Based on this study, the best time for the pre-freezing process on Kampung chicken spermatozoa is 20 minutes.

PENDAHULUAN

Ayam lokal di Indonesia adalah kekayaan alam yang merupakan aset nasional yang tidak ternilai harganya (Badaruddin *et al.*, 2013). Ayam lokal disebut juga dengan istilah ayam bukan ras (buras) atau lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai ayam kampung. Ayam kampung merupakan ayam asli Indonesia yang telah beradaptasi, hidup, berkembang, dan bereproduksi dalam jangka waktu yang lama. Dilihat dari prospek pengembangan dan permintaan pasar, ayam buras merupakan salah satu hasil peternakan yang sangat diminati pada saat ini (Aedah *et al.*, 2016). Namun dalam pengembangan ayam buras terdapat beberapa hambatan untuk pemenuhan dan pengembangan produksinya. Populasi beberapa jenis ayam buras di Indonesia terancam dengan populernya ayam ras yang menjadi bahan konsumsi protein hewani utama untuk masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya pelestarian plasma nutfah ayam buras adalah dengan kriopreservasi semen atau lebih dikenal dengan pembekuan semen. Pembekuan semen bertujuan untuk memperpanjang daya hidup spermatozoa. Hal ini sesuai dengan pendapat Feradis (2010), yang menyatakan bahwa spermatozoa yang dibekukan dan disimpan pada suhu -196°C di dalam nitrogen cair dapat bertahan hidup untuk waktu yang tak terhingga. Sedangkan menurut Fulton (2006), teknik kriopreservasi menjadi alat yang sangat berharga bagi industri unggas.

Pembekuan semen merupakan proses pengeringan fisik yang meliputi dua tahap, yaitu *pre-freezing* dan *freezing*. Proses *pre-freezing* yaitu straw yang berisi semen disusun pada rak straw dan ditempatkan dalam uap nitrogen cair. Sedangkan menurut Partodihardjo (1992), proses *pre-freezing* adalah proses setelah semen diisikan ke dalam straw yang dilakukan dengan cara diletakkan

di canister dan digantungkan dalam uap nitrogen cair selama beberapa menit.

Lama waktu *pre-freezing* menurut beberapa sumber adalah beragam. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 12207/Hk.060/F/12/2007, proses pembekuan pada tahap *pre-freezing* dilakukan selama 5-9 menit diatas nitrogen cair. Amin *et al.*, (1998) dalam penelitiannya menerapkan lama waktu *pre-freezing* adalah 10 menit di atas permukaan nitrogen cair (suhu sekitar -130°C).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa penentuan standar waktu *pre-freezing* selama ini hanya berlaku pada ternak sapi, sedangkan pada ayam buras belum diketahui secara pasti waktu *pre-freezing* yang tepat untuk diterapkan, oleh karena itu pada penelitian ini diadakan penelitian uji kualitas spermatozoa pada ayam kampung dengan waktu *pre-freezing* yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu *pre-freezing* terhadap motilitas dan RR spermatozoa ayam kampung.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun perlakuan sebagai berikut :

- P0 = tanpa *pre-freezing*
- P1 = lama *pre-freezing* 5 menit
- P2 = lama *pre-freezing* 10 menit
- P3 = lama *pre-freezing* 15 menit
- P4 = lama *pre-freezing* 20 menit

Prosedur Penelitian

Pemeliharaan Ayam Buras

Tahap pemeliharaan dimulai dengan menyiapkan kandang individu berukuran 40 x 50 x 70 cm yang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. Ayam Kampung

jantan yang digunakan untuk diambil semennya yaitu ayam sehat dan tidak cacat, dengan panjang taji minimal 0,5 cm (ayam yang berumur minimal 10 bulan). Pakan yang digunakan adalah konsentrat, dedak dan jagung.

Koleksi Semen

Koleksi atau penampungan semen pada ayam dilakukan dengan menggunakan metode pengurutan (masase) pada bagian punggung ayam jantan. Penampungan semen dilakukan oleh dua orang. Seorang memegang ayam jantan yang akan ditampung semennya dan seorang lagi melakukan pengurutan untuk mengeluarkan semen dari alat kelamin ayam sekaligus menampungnya.

Pembuatan Pengencer

Bahan pengencer dasar yang digunakan adalah ringer laktat dan kuning telur. Ringer laktat kuning telur dihomogenkan menggunakan stirrer selama 5 menit kemudian disentrifugasi selama 20 menit dengan kecepatan 2.000 rpm. Bahan pengencer dasar kemudian ditambahkan dimethylsulfoxide (DMSO) 7%, streptomisin 1 mg/ml dan penisilin 1000 IU/ml.

Pengenceran dan Pengemasan Semen

Semen yang telah diencerkan kemudian dikemas ke dalam 5 mini straw (IMV, France) 0,25 ml dengan menggunakan spoit, kemudian ujung ministraw dipanaskan pada *heating table* hingga tertutup.

Ekuilibrasi, Pre-freezing, dan Penyimpanan

Tahap ekuilibrasi yaitu semen yang telah dikemas ditempatkan di dalam kulkas pada suhu 5°C selama 2 jam (Bearden *et al.*, 2004). Tahap *pre-freezing* dilakukan dengan cara meletakkan ministraw di rak straw 4 cm di atas permukaan nitrogen cair. Masing-masing straw disimpan sesuai perlakuan waktu, yaitu 0 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Setelah itu, pada tahap *freezing* (penyimpanan) dilakukan dengan memasukkan ministraw ke dalam nitrogen cair dengan suhu -196°C selama 24 jam.

Thawing

Tahap *thawing* yaitu mencairkan semen dalam ministraw yang telah dibekukan. Proses *thawing* dilakukan dengan cara memasukkan ministraw ke dalam air hangat bersuhu 37°C selama 30 detik untuk pemeriksaan motilitas dan *recovery rate* spermatozoa.

Parameter Yang Diamati

Motilitas spermatozoa

Motilitas spermatozoa yaitu pergerakan individu spermatozoa yang pengukurannya dilakukan dengan meletakkan semen di atas gelas objek sebanyak satu tetes dan ditutup dengan *cover glass*, selanjutnya diamati pergerakannya di bawah mikroskop dengan perbesaran 16 x 40. Spermatozoa yang motil akan terlihat bergerak maju ke depan/progresif.

Recovery Rate Spermatozoa

Recovery Rate (RR) spermatozoa adalah kemampuan pemulihan spermatozoa setelah pembekuan dengan membandingkan persentase sperma motil pada semen segar dengan pasca *thawing* (Garner dan Hafez, 2000). Persentase *recovery rate* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RR = \frac{\text{motilitas spermatozoa setelah thawing}}{\text{motilitas spermatozoa segar}} \times 100 \%$$

Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis ragam berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 taraf perlakuan. Model matematika yang digunakan sebagai berikut :

$$Y_{ij} = \mu + T_i + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan :

- Y_{ij} = Hasil pengamatan pada waktu *prefreezing* ke-i dengan ulangan ke-j
- μ = Rata-rata pengamatan
- T_i = Pengaruh perlakuan ke-i
- ε_{ij} = Galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa kualitas spermatozoa dengan berbagai waktu prefreezing yang berbeda berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap motilitas spermatozoa ayam kampung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Purwasih *et al.* (2013), bahwa Proses prefreezing akan mempengaruhi gerakan individu atau daya gerak spermatozoa, persentase hidup dan abnormalitas spermatozoa.

Tabel 1. Motilitas spermatozoa ayam kampung setelah thawing dengan berbagai waktu prefreezing

Perlakuan	Motilitas Setelah Thawing (%)
P0	$0,00 \pm 0,00^a$
P1	$25,00 \pm 5,00^b$
P2	$30,00 \pm 8,67^{bc}$
P3	$30,00 \pm 5,00^{bc}$
P4	$36,67 \pm 5,77^c$

Keterangan :superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$). P0 : tanpa pre-freezing, P1 : pre-freezing 5 menit, P2 : pre-freezing 10 menit, P3 : pre-freezing 15 menit, P4 : pre-freezing 20 menit.

Persentase motilitas tertinggi ditunjukkan oleh semen dengan lama prefreezing 20 menit (P4) yaitu 36,67 % namun tidak berbeda nyata dengan waktu prefreezing 10 menit dan 15 menit. Nilai ini lebih tinggi dari waktu prefreezing 5 menit dan tanpa prefreezing. Hal ini menunjukkan semakin lama waktu prefreezing semakin meningkatkan motilitas spermatozoa setelah thawing, yang disebabkan oleh semakin lamanya waktu adaptasi bagi spermatozoa sebelum penyimpanan. Menurut Pratiwi *et al.* (2014), kurangnya waktu adaptasi spermatozoa terhadap suhu dingin sebelum dimasukkan ke dalam nitrogen cair (-196°C) menyebabkan spermatozoa banyak mengalami kerusakan akibat cold shock dan perubahan-perubahan

intraseluler yang berkaitan dengan pembentukan kristal-kristal es.

Salamon (1971) menyatakan bahwa ketika semen diuapkan (*pre-freezing*) selama beberapa menit sebelum direndam nitrogen cair, akan mempertahankan persentase gerakan individu (motilitas) spermatozoa setelah diperiksa *post thawing motility*. Pada penelitian ini (tabel 1) menunjukkan bahwa perlakuan tanpa prefreezing menyebabkan penurunan motilitas yang sangat tajam hingga 0%. Hal ini serupa dengan laporan Purwasih *et al.* (2013) bahwa gerakan individu spermatozoa sapi jawa terendah terdapat pada perlakuan tanpa prefreezing. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hal tersebut disebabkan spermatozoa mati karena mengalami cold shock. Spermatozoa akan rusak bila dibekukan langsung padasuhu dibawah 0°C , karena terjadi kejutan temperatur (*cold shock*) yang akan mengakibatkan spermatozoa kehilangan persentase hidupnya.

Tabel 2. *Recovery Rate* spermatozoa ayam kampung setelah thawing dengan berbagai waktu *prefreezing*.

Perlakuan	<i>Recovery rate</i> (%)
P0	$0,00 \pm 0,00^a$
P1	$30,51 \pm 5,19^b$
P2	$36,64 \pm 10,16^{bc}$
P3	$36,64 \pm 5,02^{bc}$
P4	$45,10 \pm 8,49^c$

Keterangan :superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata ($P < 0,01$). P0 : tanpa pre-freezing, P1 : pre-freezing 5 menit, P2 : pre-freezing 10 menit, P3 : pre-freezing 15 menit, P4 : pre-freezing 20 menit.

Motilitas spermatozoa setelah thawing dengan perlakuan waktu prefreezing 20 menit yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dari yang didapatkan pada penelitian sebelumnya pada spermatozoa ayam kampung dengan waktu *pre-freezing* 10 menit yaitu 36,25% (Khaeruddin dan Kurniawan, 2020), 31,50 % (Khaeruddin, 2020), 32% (Khaeruddin *et al.*, 2020), 21,25%

(Khaeruddin *et al.*, 2019). Hasil penelitian ini juga lebih tinggi dari penelitian Malik (2018) bahwa motilitas spermatozoa ayam kampung dengan waktu prefreezing 4 menit yaitu 29,27 %.

Recovery Rate (RR) spermatozoa adalah kemampuan pemulihan spermatozoa setelah pembekuan dengan membandingkan persentase sperma motil pada semen segar dengan pasca thawing (Garner dan Hafez, 2000). Dari hasil analisis ragam menunjukkan perlakuan waktu pre-freezing berpengaruh sangat nyata ($P < 0,01$) terhadap nilai RR. Pada waktu prefreezing 20 menit (P4) menunjukkan persentase Recovery Rate paling tinggi yakni $45,10 \pm 8,49$ %. Nilai ini lebih tinggi dari hasil penelitian sebelumnya yaitu 25,13-36,83 % (Khaeruddin *et al.*, 2019) dan 27,10-35,4% (Khaeruddin *et al.*, 2020) menggunakan waktu *pre-freezing* 10 menit.

KESIMPULAN

Lama waktu *pre-freezing* berpengaruh terhadap motilitas dan *recovery rate* spermatozoa ayam kampung. Lama proses *pre-freezing* yang terbaik yaitu 20 menit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedah, S., Djoefrie, M.H.B., & Suprayitno, G. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri unggas ayam kampung (studi kasus PT Dwi dan Rachmat Farm, Bogor). *Manajemen IKM*, 11(2), 173-182.
- Amin, M.R., Toelihere, M. R., Yusuf, T.L., & Situmorang, P. (1999). Pengaruh plasma semen sapi terhadap kualitas semen beku kerbau lumpur (*Bubalus bubalis*). *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner*, 4(3), 143-147.
- Badaruddin, R.J., Hafoloan, T., & Yuanta. (2013). Analisis fenotip genetik ayam kampung tolaki pada masa pertumbuhan. *Jurnal Peternakan UGM*, 37 (2), 79-86.
- Bearden, H.J., Fuquay, J.W., & Willard ST. (2004). *Applied animal reproduction*. 6th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Feradis. (2010). *Bioteknologi reproduksi pada ternak*. Bandung: Alfabeta.
- Fulton, J.E. (2006). Avian genetic stock preservation: An industry perspective. *Poult Sci*, 85, 227-231.
- Garner, D.L.E., & Hafez, S.E. (2000). Spermatozoa and seminal plasma. In: *Reproduction in farm animals*. 7th Ed B Hafez/ESE Hafez USA: Lippincott Williams & Wilkins.
- Khaeruddin. (2020). Pembekuan spermatozoa ayam kampung dengan suplementasi bovine serum albumin dan putih telur dalam pengencer ringer laktat kuning telur. *Ternak Tropika*, 21(2), 111-222.
- Khaeruddin, Junaedi, & Hastuti. (2020). Cryopreservation of Indonesian native chicken semen by using dimethyl sulfoxide and various level of ethylene glycol as cryoprotectants. *Biodiversitas*, 21 (12), 5718-5722.
- Khaeruddin, & Kurniawan, M.E. (2020). Keberhasilan pembekuan semen ayam yang diencerkan dengan glukosa, trehalosa, sukrosa dan laktosa. *Jurnal Veteriner*, 21(3), 476-484.
- Khairuddin, Kurniawan, M.E., & Soman. (2019). Cryopreservation of Kampung rooster semen using egg yolk diluent from four types of poultry with different concentrations. *Jurnal Kedokteran Hewan*, 13(3), 60-65.
- Malik, A. (2018). Penambahan madu pada pengencer *skim milk-egg yolk* terhadap motilitas spermatozoa pasca thawing pada ayam kampung.

- Prosiding seminar nasional kebangkitan peternakan III. 38-42.
- Partodihardjo. (1992). Ilmu reproduksi hewan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Pratiwi, R.I., Suharyatib, S., & Hartono, M. (2014). Analisis kualitas semen beku sapi simmental menggunakan pengencer andromed dengan variasi waktu prefreezing. Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu, 2(3), 8-15.
- Purwasih, R., Ondho, S.Y., & Sutopo. (2013). Efektivitas prefreezing semen sapi jawa sebagai parameter keberhasilan processing semen beku. Animal Agriculture Journa, 2(1), 44-50.
- Salamon, S. (1971). Fertility of ram spermatozoa following pellet freezing on dry ice at -79°C and -140°C . Aust. J. Biol.Sci, 24, 183-185.